

La Ronce commune

(*Rubus fruticosus*)

Famille : Rosaceae

Origine : Eurasie

Floraison : mai - août

Plantation : printemps ou automne

Préférences : tous types de sols, neutres, frais, humifères, bien drainés, au soleil ou à mi ombre, rustique (-25°C)

Milieus : haies, fourrés, lisières de bois, friches, déprise agricole, bords chemins ...

Très fréquente dans de nombreux habitats, elle fournit pollen et nectar de qualité et en abondance à une grande diversité de pollinisateurs, lors des périodes de disette. Sa morphologie ouverte et aplatie convient aux insectes à langue courte.

Le fruit (mûre / mûron) est composé de 20 à 50 petites drupes agglomérées, d'abord rouges puis violet-noir brillant à maturité (fin août/septembre). Parfumées, sucrées, et riches en vitamines et sels minéraux, elles sont aussi appréciées des oiseaux, insectes et mammifères.



Egalement appelée Ronce ligneuse, Ronce des haies/ des bois ou Mûrier sauvage, la Ronce commune regroupe en réalité nombreuses espèces polymorphes sous son appellation, difficiles à distinguer.

Réputé par ses fruits savoureux mais aussi par sa végétation dense et impénétrable, cet arbrisseau utilise ses épines pour se protéger des herbivores, créant ainsi un refuge pour nombreux oiseaux, insectes, mammifères et pour les plantules d'arbres.



Forte disponibilité en fleurs entre juin et juillet



La ronce : le stade intermédiaire entre prairie et forêt



Réseau Biodiversité
pour les Abeilles



étamines groupées au centre, autour des styles courts

Fleurs hermaphrodites, groupées en corymbes, à 5 pétales étalés blanc/rose et 5 sépales, inflorescence à l'extrémité des rameaux



Hauteur : 1 à 5 m

Tiges souples, bisannuelles, arquées et très épineuses, anguleuses et vigoureuses, dressées ou rampantes

Feuilles composées palmées à 3-7 folioles ovales, alternes, pétiolées, dentées, vertes dessus, blanc/gris duveteux dessous, nervures épineuses