

Bleuet des champs ou sauvage (*Centaurea cyanus*)

Coupe longitudinale de la fleur



Famille : Astéracée

Origine : Europe et Asie du Nord

Plantation : automne et printemps

Floraison : mai à juillet

Préférence : tous les sols légèrement acides. Au soleil

Milieus : massifs, prairies fleuries, bords de chemin, décombres, ...



Halictus scabiosae sur un bleuet des champs

Flieurs regroupées en capitule



Capitule : Fleurs tubulées de couleur bleue. Les fleurs de la périphérie sont rayonnantes et beaucoup plus grandes que celles au centre.

Fleurons de 2 types :

Fleurons au centre tubulés, à pétales courts et étroits, bleus foncés. Fleurons marginaux, plus grands formés d'une grande ligule bleue en forme d'éventail à 5 dents effilées.

Involucre : ovoïde, formé de bractées tomenteuses aux extrémités denticulées disposées irrégulièrement

Feuilles alternes simples avec une base simple.

Feuilles de la base : profondément découpées et pétiolées.

Limbe mince au bord garni de très petites dents, bord faiblement denté et sommet pointu

Feuilles de la tige : entières, à bords parallèles et pétiolées

Face inférieure et supérieure : tomenteuses

Tige pleine, dressée, ramifiée.

Surface cannelée et tomenteuse

30 à 80 cm

